

Janssen Inc. est heureuse d'annoncer que...

# INVOKANA® est l'iSGLT2 le plus délivré lorsqu'il est prescrit par les néphrologues au Canada<sup>1\*</sup>

INVOKANA® (canagliflozine) est indiqué en monothérapie comme traitement d'appoint à un régime alimentaire et à l'exercice physique pour améliorer le contrôle de la glycémie chez les adultes atteints de diabète de type 2 pour qui la metformine ne convient pas en raison de contre-indications ou d'intolérance<sup>2</sup>.

INVOKANA® est aussi indiqué chez les adultes atteints de diabète de type 2 pour améliorer le contrôle de la glycémie en association avec :

- la metformine
- une sulfonylurée (avec ou sans metformine)
- la pioglitazone et la metformine
- la metformine et la sitagliptine
- l'insuline (avec ou sans metformine)

lorsque les traitements énumérés ici, jumelés

avec un régime alimentaire et l'exercice physique, ne permettent pas d'obtenir un contrôle adéquat de la glycémie<sup>2</sup>.

INVOKANA® est aussi indiqué comme traitement d'appoint à un régime alimentaire, à l'exercice physique et aux normes de soins pour réduire le risque d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs (décès d'origine CV, IM non mortel et AVC non mortel) chez les adultes atteints de diabète de type 2 et d'une MCV établie<sup>2</sup>.

iSGLT2 = inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose de type 2; CV = cardiovasculaire; IM = infarctus du myocarde; AVC = accident vasculaire cérébral; MCV = maladie cardiovasculaire.

\* D'après le nombre total d'ordonnances d'iSGLT2 délivrées par des néphrologues seulement, selon la base de données canadienne CompuScript d'IMS Health, juin à novembre 2019.

**Pr** **Invokana**<sup>®</sup>  
comprimés de canagliflozine

INVOKANA® est aussi MAINTENANT indiqué comme traitement d'appoint à un régime alimentaire, à l'exercice physique et aux normes de soins pour réduire le risque d'insuffisance rénale terminale, de doublement du taux de créatinine sérique et de décès d'origine CV chez les adultes atteints de diabète de type 2 et de néphropathie diabétique avec albuminurie ( $> 33,9$  mg/mmol)<sup>2</sup>.



Veillez consulter la monographie de produit à l'adresse [www.janssen.com/canada/fr/products](http://www.janssen.com/canada/fr/products) pour des renseignements importants concernant l'usage clinique, les contre-indications, les mises en garde et précautions importantes, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses, la posologie et l'administration qui n'ont pas été abordés dans ce document.

Vous pouvez également vous procurer la monographie de produit en composant le 1-800-567-3331.

CV = cardiovasculaire.

- Références :** 1. Base de données canadienne CompuScript d'IMS Health, juin à novembre 2019.  
2. Monographie d'INVOKANA®, Janssen Inc., 23 janvier 2020.

**Invokana**<sup>®</sup>  
comprimés de canagliflozine

**Janssen Inc.** 19 Green Belt Drive | Toronto (Ontario) | M3C 1L9 | [www.janssen.com/canada/fr](http://www.janssen.com/canada/fr)

© 2020 Janssen Inc. | Marques de commerce utilisées sous licence. | CP-144481F