



À quel point connaissez-vous la néphropathie chronique en présence de diabète de type 2 ?

L'INFLAMMATION ET LA FIBROSE

PEUVENT ENDOMMAGER LES REINS DE VOS PATIENTS^{1,2}

LA PROGRESSION DE LA NÉPHROPATHIE CHRONIQUE CHEZ LES ATTEINTS DE DIABÈTE DE TYPE 2 DÉPEND DE 3 PRINCIPAUX FACTEURS PATHOPHYSIOLOGIQUES²



Facteurs métaboliques

- Taux élevés de glycémie



Facteurs hémodynamiques

- Hypertension artérielle
- Pression intraglomérulaire élevée



Facteurs inflammatoires et fibrotiques

- Cytokines pro-inflammatoires
- Protéines fibrotiques

Bien connaître la maladie pour protéger les reins des patients

Plus d'information sur la progression de la néphropathie chronique au www.ckdandt2d.ca/fr



®MC voir www.bayer.ca/tm-mc
© 2021, Bayer Inc.
MA-M_FIN-CA-0051-1

Références: 1. Mihai S, Codrici E, Popescu ID, et al. Inflammation-Related Mechanisms in Chronic Kidney Disease Prediction, Progression, and Outcome. *J Immunol Res.* 2018;2018:2180373. 2. Alicic RZ, Johnson EJ, Tuttle KR. *Adv Chronic Kidney Dis.* 2018 Mar;25(2):181-191.