


INVOKANA[®]

EST LE PREMIER iSGLT2* INDIQUÉ :

Comme traitement d'appoint à un régime alimentaire, à l'exercice physique et aux normes de soins pour réduire le risque d'insuffisance rénale terminale, de doublement du taux de créatinine sérique et de décès d'origine CV chez les adultes atteints de diabète de type 2 et de néphropathie diabétique avec albuminurie (> 33,9 mg/mmol).



Veuillez consulter la monographie de produit à l'adresse www.janssen.com/canada/fr/products pour des renseignements importants concernant l'usage clinique, les contre-indications, les mises en garde et précautions importantes, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses, la posologie et l'administration qui n'ont pas été abordés dans ce document.

Vous pouvez également vous procurer la monographie de produit en composant le 1-800-567-3331.

iSGLT2 = inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose de type 2; CV = cardiovasculaire.

* La portée clinique comparative n'a pas été établie.

Pr **Invokana[®]**
comprimés de canagliflozine

RECOMMANDATIONS POSOLOGIQUES D'INVOKANA® SELON LE DFGe AU MOMENT DE L'INSTAURATION DU TRAITEMENT

DFGe $\geq$ 60 mL/min/1,73 m ²	100 mg une fois par jour. La dose peut être portée à 300 mg une fois par jour pour un meilleur contrôle de la glycémie.
DFGe de 30 à < 60 mL/min/1,73 m ²	100 mg une fois par jour.
Patient sous dialyse	L'emploi est contre-indiqué.

D'après la monographie d'INVOKANA®

Chez les patients ayant déjà commencé un traitement et présentant un DFGe inférieur à 30 mL/min/1,73 m² et une albuminurie supérieure à 33,9 mg/mmol, le traitement peut être poursuivi à la dose de 100 mg une fois par jour.

- >> Le traitement par INVOKANA® à 100 mg ne doit pas être instauré chez les patients qui présentent un DFGe inférieur à 30 mL/min/1,73 m².
- >> L'administration d'INVOKANA® à 100 mg doit être arrêtée dès lors que le patient a recours à la dialyse.

Veuillez consulter la monographie d'INVOKANA® pour les renseignements complets sur la posologie et l'administration.

DFGe = débit de filtration glomérulaire estimé.


Référence : Monographie d'INVOKANA® (canagliflozine), Janssen Inc., 20 mai 2020.

Invokana®
comprimés de canagliflozine

L'image présente des modèles et sert à des fins d'illustration seulement.

Janssen Inc. 19 Green Belt Drive | Toronto (Ontario) | M3C 1L9 | www.janssen.com/canada/fr

© 2021 Janssen Inc. | Marques de commerce utilisées sous licence. | CP-236286F



janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF
Johnson & Johnson